

## セセリチョウ上科 (Hesperiidae)



属 種小名 *Bibasis gomata*  
 英名  
 和名 **ウラジロビロードセセリ**  
 分布 India~Celebes  
 開長 52mm  
 'フコキ科のオオノコノキ (Schefflera actinophylla) c.f. 文献2①  
 食草



属 種小名 *Bibasis harisa*  
 英名  
 和名 **メスアオビロードセセリ**  
 分布 Assam~Sundaland  
 開長 50mm  
 食草 アカネ科のUrophyllum c.f.文献2①



属 種小名 *Unkana mytheca*  
 英名  
 和名 **タコノキセセリ**  
 分布 タイランド~フィリピン~スンダランド  
 開長 33mm♂  
 食草 タコノキ科のアダン (Pandanus odoratissimus) c.f.文献2①

計16種でその大半がインド・マレーを中心とした東南アジアの熱帯に生息。青く輝いた美しい種がある。



属 種小名 *Choaspes stigmatus*  
 英名  
 和名 **アッサムアオバセセリ**  
 分布 Assam~Sundaland  
 開長 55mm  
 食草 アワブキ科のアワブキ c.f.文献2①



属 種小名 *Choaspes hemixanthus*  
 英名  
 和名 **キシタアオバセセリ**  
 分布 セレベス~ニューギニア  
 開長 55mm  
 食草 クロタキカズラ科のRhithicaryum longifolium c.f.文献2①



属 種小名 *Tagarides tova*  
 英名  
 和名 **トガリシロシタセセリ**  
 分布 Malaya  
 開長 33mm♂  
 食草 ヤマイモ科のDioscorea alata c.f.文献2①

互いによく似た6種からなり、インド~中国~ニューギニアに生息し、日本にも広がる。暗緑色で体下面や後翅下端に黄橙色のある美麗種。

1種を除いて後翅の下端が白色のセセリ。アフリカが分布の中心だがインド・オーストラリア区に広がる。