

セセリチョウ上科 (Hesperiidae)



属 Abraximorpha
 種小名 davidii
 英名 Checkered Flat
 和名 **ユウマダラセセリ**
 分布 インドシナ北部・中国南部・台湾
 開長 44mm ♀
 食草 バラ科の *Rubus reflexus* c.f.文献2①

台湾の山地の路傍でよく見かける蛾のようなセセリ。飛翔も敏捷でなく、翅を開いて止まる。



属 Erionota
 種小名 torus
 英名 Checkered Flat
 和名 **バナナセセリ**
 分布 Checkered Flat
 開長 70mm ♀
 食草 バショウ科のバショウ、バナナなど c.f.文献2①

東洋の熱帯に広く分布する大型のセセリで8種あまりが知られている。低山地のバナナの植えられたところを夕方活動する。



属 Telicota
 種小名 hilda
 英名 Bright Red Velvet Bob
 和名 **オオアカセセリ**
 分布 タイビルマ国境・マレ・ボルネオ・パラ
 開長 35mm ♀
 食草 イネ科のササキビ (*Staria palmifolia*) c.f.文献2①

八重山にも一種いる東洋熱帯からオーストラリアに分布する属で、20余種の大部分がニューギニアにおり、東洋熱帯には数種類いるだけ。



属 Parnara
 種小名 apostata
 英名 /
 和名 **ミナミイチモンジセセリ**
 分布 タイビルマ国境・マレ・ボルネオ
 開長 34mm ♂
 食草 イネ科の植物 c.f.文献2①

よく似た属が3種あるが日本のイチモンジセセリの属するこのParnaraは触覚が短いことで区別できる。東洋の稲作と関係が深いと言われる。



属 Koruthaialos
 種小名 sinda
 英名 Bright Red Velvet Bob
 和名 **ベニモンセセリ**
 分布 ビルマ～スンダランド・パラワン
 開長 50mm ♀
 食草 バショウ科のバナナの一種 *Musa sapientum* c.f.文献2①

マレー半島のバナナのある村落周辺の樹林下で見かける。