

シジミタテハ科 (Riodinidae)



属 Dodona
種小名 eugenes
英名
和名 シジミタテハ
分布 ヒマラヤ～タイ・ベトナム～中国・台湾
開長 40mm
食草 ヤブコウジ科のMyrsine semiserrata c.f.文献2①

この属は、東南アジアに10数種あり。台湾にいるこの種は山地に発生する珍種だが、ヒマラヤではさにあらず。敏捷に飛ぶが路上に止まることが多い。



属 Laxita
種小名 damajani
英名
和名 アカオビシジミタテハ
分布 ビルマ～スダラント
開長 45mm
食草 ?

ビルマ～スダラントにかけて4種。中でも本種は最も美しい種。森林の奥深くに生息し、木の葉に止まっているのが見られる。i



属 Abisara
種小名 kausambi
英名
和名 シロオビイロヒョットコ
分布 ビルマ～スダラント
開長 42mm
食草 ヤブコウジ科のEmbelia dasythyrsa c.f.文献2①

東南アジアと熱帯アフリカにそれぞれ10種ほど。熱帯低地の森林に住み朝夕に開けて場所に出てくる。



属 Abisara
種小名 saturata
英名
和名 エビイロヒョットコ
分布 ス
開長 44mm
食草 ヤブコウジ科のMaesa ramentacea(キダチイ
ズセンリョウ) c.f.文献2①