


セセリチョウ上科 (Hesperiidae)



属 Chaospes
種小名 benjaminii
英名 IndianAwkking
和名 **アオバセセリ**
分布 日本～東アジア
開長 50mm
食草 [アワブキなどのアワブキ科](#)



属 Chaospes
種小名 benjaminii
英名 IndianAwkking
和名 **アオバセセリ裏**
分布 日本～東アジア
開長 50mm
食草



属 Parnara
種小名 guttata
英名
和名 **イチモンジセセリ**
分布 インド北部～中国大陸～東南アジア～日本
開長 35mm
食草 イネ、ススキなどのイネ科

よく似た属が3種あるが日本のイチモンジセセリの属するこのParnaraは触覚が短いことで区別できる。東洋の稲作と関係が深いと言われる。



属 Pyrgus
種小名 malvae
英名 GrizzledSkipper
和名 **ヨーロッパチャマダラセセリ**
分布 欧州～西アジア
開長 20mm
食草 [キジムシロ属の草](#)



属 Erynnis
種小名 montanus
英名
和名 **ミヤマセセリ**
分布 日本～東アジア
開長 36mm
食草 クヌギ、アベマキ、コナラなどのブナ科

本属は、ミヤマセセリが代表種。東アジアに生息し、春～晩春に出るミヤマセセリmontanusと欧州から中国に分布するtagesの2種。



属 Daimio
種小名 tethys
英名
和名 **ダイミョウセセリ**
分布 日本～中国大陸～ビルマ北部
開長 36mm
食草 [ヤマノイモ、ナガイモなどのヤマノイモ科](#)

一属一種。成虫は樹林の下草を飛び飛翔は敏捷であるが、すぐに翅を開いて葉の上にとまる。

本属は代表種は日本にも生息する上記の美麗種benjaminiiでよく似たものが6種ありインド～オーストラリア区にも分布。林間の開いた空気を縄張りとして飛び、ヤマブキなどの多くの花に吸蜜にくる。

互いによく似た6種からなり、インド～中国～ニューギニアに生息し、日本にも広がる。暗緑色で体下面や後翅下端に黄橙色のある美麗種。