

シジミチョウ科 (Lycaenidae)



属 Favonius
種小名 orientalis
英名
和名 **オオミドリシジミ**
分布 日本～ユーラシア中部
開長 40mm
食草 クヌギなどのブナ科

本属は青空色に光るミドリシジミの一群。日本～ユーラシアの中部にかけて分布。日本だけでも近似種が8種で大陸のもの種の識別は困難。食草はブナ科。



属 Japonica
種小名 saepestrata
英名
和名 **ウラナミアカシジミ裏**
分布 日本～ウスリ
開長 42mm
食草 ブナ科のクヌギ・アベ、マキ

東北アジアのアカシジミやウラナミアカシジミを含む属でミドリシジミ族において進化的には原始的な属。



属 Wagimo
種小名 signata
英名
和名 **ウラミスジ裏**
分布 東アジア
開長 34mm
食草 ブナ科のクヌギなど

本属は、日本と東北アジアに生息するウラミスジシジミと台湾や中国大陸の台湾ウラナミの2種でミドリシジミの中では分化が進んだもの。



属 Lycaena
種小名 dispar
英名 LargeCopper
和名 **チョウセンベニシジミ**
分布 韓国～欧州
開長 40mm
食草 **ギンギン**

ベニシジミの群で全北区を中心に北アフリカ、南アフリカ、ニュージーランドに分布する。旧北区には種が多く、細分されているが差は小さい。すべてタデ科のギンギン族を食べる。



属 Lycaena
種小名 hypothoe
英名
和名 **ヒポトーエベニシジミ**
分布 欧州
開長 38mm
食草



属 Lycaena
種小名 phlaeas
英名 SmallCopper
和名 **ベニシジミ**
分布 旧北区
開長 30mm
食草 **スイバ・ギンギン**