

## シジミチョウ科 (Lycaenidae)



属 Thecla  
 種小名 betulae  
 英名 Brown Hairstreak  
 和名 **チョウセンアカシジミ**  
 分布 韓国～欧州  
 開長 44mm  
 食草 スモノ、スロー、カバノキ

本属は、旧北区ではbetula(チョウセンメスアカシジミ)とbetulaeの2種だけ。



属 Lycaedes  
 種小名 argirognomon  
 英名 /  
 和名 **ミヤマシジミ**  
 分布 ユーラシヤ～日本  
 開長 34mm  
 食草 ミヤコグサ・コマツナギ・カワラヨモギ  
 本属の他よく似た2属を含む類は、ユーラシア大陸から北米にかけてたくさん  
 の種を含み分類が困難である。そこでこ  
 れらをヒメシジミ類と総称すると、ユーラ  
 シヤだけで125種、北米で15種と多くの  
 種を含む。



属 Celastrina  
 種小名 oreas  
 英名 Tailed Cupid  
 和名 **アリサンルリシジミ**  
 分布 台湾～中国  
 開長 26mm  
 食草 バラ科のサイカモドキ、ツバキ科のミヤマヒサカキ

本属は約60種でよく似たものがおおく、同定は困難。北はユーラシアから南はオーストラリア、新大陸では中米以北。南は個体数が少ない。



属 Curetis  
 種小名 acuta  
 英名  
 和名 **ウラギンシジミ**  
 分布 ヒマラヤ～中国大陸南部～日本  
 開長 45mmUP  
 食草 フジ、クズ、クララなど



属 Curetis  
 種小名 acuta  
 英名  
 和名 **ウラギンシジミ**  
 分布 ヒマラヤ～中国大陸南部～日本  
 開長 45mmUN

すべて裏が銀色の種を含む属で日本を含む東南アジアの特産種。十数種類生息。日本にはこの種が一種類いて、暖地の普通種