

ジャノメチョウ科 (Satyridae)



属 Chazara
種小名 pieuri
英名 Southern Hermit
和名 **ピューリヒカゲ**
分布 欧州
開長 66mm ♀

Chazara属はアフリカ北部、スペイン、フランス西・小アジアのヒカゲチョウ。低地から2000mまで、6月以降に出現。二種あり、隠者のニックネームがある。



属 Hipparchia
種小名 aristaeus
英名 Southern Grayling
和名 **アリスタエウスタカネヒカゲ**
分布 北アフリカ～小アジア
開長 54mm ♀

この属はアフリカ北部から西欧を経てユーラシア中部に分布。岩山の傾斜地に6, 7, 8月に出現。



属 Erbia
種小名 aethiops
英名 Scotch Argus
和名 **アエティオプスベニヒカゲ**
分布 欧州～小アジア
開長 40mm

ベニヒカゲが代表種。環北極の蝶。温帯では高地に生息。一世代1年のものと2年のものがある。♀は草原の地上に産卵。食草はカヤツリグサ科とイネ科。



属 Melanargia
種小名 galathes
英名 Mabled White
和名 **セイウヒカゲ**
分布 西ヨーロッパ～北イラン
開長 52mm ♀

Melanargia属は韓国を含むユーラシア大陸からアフリカ北部にまで広く分布する。海拔0～1500mに6, 7月に出現。