

## ホソチョウ科 (Acraeidae)



属名 Acraea  
種小名 encedon  
英名 Common acraea  
和名 エンケドンホソチョウーS形  
分布 S.Africa  
開長 70mm  
食草 Commelina(ツユクサ)



属名 Acraea  
種小名 encedon  
英名 Common acraea  
和名 エンケドンホソチョウーK形  
分布 Kenya  
開長 70mm  
食草 Commelina(ツユクサ)



属名 Bematistes  
種小名 johnstoni  
英名 Johnston's Acraea  
和名 ジョストンホソチョウ  
分布 Kenya,Uganda,Tanzania  
開長 66mm♂



属名 Bematistes  
種小名 johnstoni  
英名 Johnston's Acraea  
和名 ジョンストンホソチョウ  
分布 Kenya,Uganda,Tanzania  
開長 66mm♀

ミュラー型擬態とは、まずい味や毒をもち、同一地域に住むなん種類かの動物が、互いに似通った外見をもって  
いるものをいう。こうすることで、鳥などの外敵が、彼らをまずい品だと学習するために必要な一種あたりの犠牲  
を減らすことができると考えられている。この例は、科の相違する有毒ただし、ミュラー型擬態は系統的に近縁の  
グループ内で見られることが多いが、上の種は科を異にするマダラとの擬態であり、明らかにミュラー形擬態で  
その典型ともいえるものである。